

## علائم و نشانه های آفت دهان

### آفت دهان چیست؟

به زخم های عود کننده و دردناک مخاط دهان آفت گفته می شود. این زخمها معمولا گرد دردناک در داخل دهان با لایه سفید در مرکز و هاله قرمز و التهاب در اطراف آن می باشد. ممکن است در روی زبان کام نرم روی لثه ها و فضای داخل دهان ایجاد شود. معمولا قبل از ظهور آفت در دهان بیمار احساس خارش سوزش و درد مینماید. آفت دهان در چند اندازه از کوچک تا بزرگ در دهان بوجود می آید.

### آفتین ژل چیست؟

آفتین ژل محصولی کاملا جدید حاوی عصاره گیاهی که معمولا با یکبار مصرف و در زمان ۲۰ ثانیه آفت دهان را درمان مینماید درد و ناراحتی بیمار بعد از چند دقیقه کاهش یافته و آثار آفت دهان بعد از مدت کمی التیام و بهبود می یابد.

آفتین ژل برای درمان تمامی موارد کوچک و بزرگ آفت و مراحل مختلف تشکیل آن توصیه میگردد.

**نکته مهم:** استفاده به موقع در مراحل اولیه که همراه با درد و سوزش میباشد از تشکیل و بوجود آمدن آفت دهان جلوگیری مینماید



قبل از استفاده از آفتین ژل



بعد از استفاده از آفتین ژل

علل بروز آفت دهان و پیشگیری از آن  
علت اصلی آفت دهان هنوز ناشناخته میباشد  
ولیکن رعایت شرایط زیر در کنترل آن میتواند کمک کننده باشد:

- ۱ رعایت بهداشت دهان
۲. از مصرف غذاهای تحریک کننده مثل گردو گوجه فرنگی پرهیز کنید
۳. کسب ویتامین گروه ب و ث میتواند در ایجاد آفت دهان موثر باشد.
۴. دوری از استرس و شرایط استرس زا
- ۵ استفاده به موقع از آفتین ژل در مراحل اولیه ایجاد آفت دهان

### عوارض جانبی

از آنجا که آفتین ژل روی مخاط سالم در زمان ذکر شده اثری ندارد لذا هیچ گونه عوارض جانبی تا کنون مشاهده نشده است.  
در صورت سابقه آلرژی به ترکیبات گیاهی و یا طعم دهنده و رنگ خوراکی بهتر است با نظر پزشک استفاده گردد.

**صرف آفتین ژل در بارداری و شیردهی**  
صرف در بارداری و شیردهی با استفاده درست و شستشوی کامل و اطمینان از عدم خوردن ژل پلامانغ میباشد در آفت های انتهای دهان و زبان و نزدیک حلق بعلت احتمال خوردن استفاده نگردد

### هشدارها

۱. از دسترس اطفال دور نگه داشته شود.
۲. ژل آفتین فقط جهت درمان آفت دهان ساخته شده است. از استفاده آن در موارد غیر از آفت دهان اکیدا خودداری شود. و در سایر موارد به دندانپزشک یا پزشک مراجعه فرمایید.
۳. در صورت خورده شدن مقادیر زیاد ژل کمی شیر یا شربت سعه حاوی سبزییم استفاده شود.
۴. در بیماران مزمن کبدی و یا کلیوی در آفت هایی که در انتهای دهان و زبان و نزدیک حلق ایجاد شده است بعلت احتمال خوردن استفاده نگردد

### صرف آفتین ژل در کودکان

بعلت سوزش در حین درمان و عدم تحمل کودکان جهت کودکان زیر ۵ سال توصیه نمیشود. در کودکان بالای ۵ سال با اطمینان از استفاده دقیق و شستشوی کامل و اطمینان از عدم خوردن دارو و پلامانغ میباشد. در آفت های که در انتهای دهان و زبان بوجود آمده اند بعلت احتمال خوردن بهتر است استفاده نگردد

محصول شرکت کاوشگران سلامت بنیان  
مستقر در مرکز رشد تجهیزات و زیست مواد دندانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران  
دارای پروانه ساخت ۶۶۴/۳۳۰۴۶۹  
از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی